

附件 2

常见水生生物外来种、杂交种和选育种名录（禁止放流物种）

序号	物种学名	拉丁文名	别名或俗名	原产地	禁止放流区域	类别	主要危害
1	镜鲤	<i>Cyprinus carpio</i> <i>var. specularis</i>	散鳞镜鲤、三道鳞、铁背鱼	欧洲	全国	国外外来物种	进入自然水域，可能占据本地鲤的生态位，并对本地鲤造成遗传侵蚀
2	乌克兰鳞鲤	<i>Cyprinus carpio</i> <i>ukrainian</i>	俄罗斯鲤	俄罗斯	全国	国外外来物种	进入自然水域，可能占据本地鲤的生态位，并对本地鲤造成遗传侵蚀
3	麦瑞加拉鲮	<i>Cirrhinus mrigala</i>	麦鲮、印鳊	印度、孟加拉国	全国	国外外来物种	具有生长速度快，适应能力强，对水质要求不高，在华南水域存在较高的入侵风险。由于与土鲮生态习性相似，其扩散至天然水域可能对土鲮野生种群造成不利影响
4	露斯塔野鲮	<i>Labeo rohita</i>	泰鲮、南亚野 鲮	孟加拉国、印度、缅甸、尼泊尔、巴基斯坦、斯里兰卡	全国	国外外来物种	具有适温广、耐低温、耐低氧、耐盐碱等特性，易在自然水域生存，其入侵的主要危害是与土著鱼类竞争食物与栖息地，特别是盐碱水域的土著鱼类
5	短头梭鲃	<i>Luciobarbus</i> <i>brachycephalus</i>	大鳞鲃、淡水银鲃鱼、短头亮鲃	乌兹别克斯坦的阿姆河	全国	国外外来物种	具有适温广、耐低温、耐低氧、耐盐碱等特性，易在自然水域生存，其入侵的主要危害是与土著鱼类竞争食物与栖息地，特别是盐碱水域的土著鱼类
6	泰国高体鲃	<i>Barbonynus</i> <i>schwanenfeldii</i>	泰国鲫、双线鲃、红鳍鲫、施氏高体鲃	泰国、印尼、婆罗洲	全国	国外外来物种	摄食量大，繁殖力强，可与本地种杂交，使本地种种质资源混杂并且挤压本地种的生存空间

常见水生生物外来种、杂交种和选育种名录（禁止放流物种）

序号	物种学名	拉丁文名	别名或俗名	原产地	禁止放流区域	类别	主要危害
7	短盖巨脂鲤	<i>Piaractus brachypomus</i>	淡水白鲳、短盖肥脂鲤	南美洲亚马逊河 流域	全国	国外外来 物种	凶猛肉食性鱼类，对其他生物的生存造成威胁， 破坏生物多样性
8	美国大口胭脂 鱼	<i>Ictiobus cyprinellus</i>	巨口胭脂鱼、牛鲤	北美的密西西比 河流域	全国	国外外来 物种	适应性能较强，适温范围广，耐低氧、生长速度 快，与土著鱼类竞争生活空间与饵料资源
9	纳氏锯脂鲤	<i>Pygocentrus nattereri</i>	红肚食人鱼、红腹水虎 鱼、食人鱼、红腹锯鲑脂 鲤	南美洲亚马逊河 流域	全国	国外外来 物种	习性凶猛，听觉高度发达，牙齿尖锐异常，在南 方广大地区均适合其生存，一旦流入自然水域将 打破生物链，威胁本土鱼类，对渔业资源和生产 造成重大损失。
10	高身银板鱼	<i>Metynnis hypsauchen</i>	皇冠银板	南美洲圭亚那和 巴拉圭北部溪流	全国	国外外来 物种	性情较为凶猛，有攻击性，会攻击本地种并且捕 食幼鱼
11	黑裙鱼	<i>Gymnocorymbus ternetzi</i>	黑牡丹、黑衬裙、黑扯旗 鱼、半身鱼、黑扯旗	南美洲亚马逊河 流域	全国	国外外来 物种	繁殖能力强，并且会吞食鱼卵，易形成本地种群， 与本地土著种竞争生存空间及饵料资源
12	红吻半线脂鲤	<i>Hemigrammus rhodostomus</i>	红鼻剪刀	南美洲巴西、委 内瑞拉境内亚马 逊河下游	全国	国外外来 物种	适应力、繁殖能力较强，易形成稳定种群
13	布氏半线脂鲤	<i>Hemigrammus bleheri</i>	红鼻剪刀	南美洲巴西、委 内瑞拉境内亚马 逊河下游	全国	国外外来 物种	适应力、繁殖能力较强，易形成稳定种群
14	断线脂鲤	<i>Phenacogrammus interruptus</i>	刚果扯旗	非洲刚果河流域	全国	国外外来 物种	对水质要求不高，适应能力强，主要危害是与土 著鱼类竞争食物与栖息地

常见水生生物外来种、杂交种和选育种名录（禁止放流物种）

序号	物种学名	拉丁文名	别名或俗名	原产地	禁止放流区域	类别	主要危害
15	条纹鲮脂鲤	<i>Prochilodus lineatus</i>	巴西鲷、南美鲱鱼、小口脂鲤	巴西南部的巴拉那河和巴拉圭水系	全国	国外外来物种	耐低氧，环境适宜性强，生长速度快，与本地土著种竞争生存空间及饵料资源
16	斑点叉尾鲷	<i>Ictalurus punctatus</i>	沟鲶、钳鱼、鲶鱼	美洲大陆从加拿大南部到墨西哥北部	全国	国外外来物种	耐低氧，对环境适应性强，在自然水体可能占据本地鲇等鱼类的生态位，挤压本地种的生存空间
17	褐首鲇	<i>Ictalurus nebulosus</i>	斑鲇、褐首鲶、美国鲇、云斑鲇	北美洲淡水水系	全国	国外外来物种	具有较强的抗寒能力，适应能力强，与本地其他小型鲇类形成竞争并逐渐替代，影响生物多样性
18	红尾鲇	<i>Phractocephalus hemiliopterus</i>	军舰鸭嘴、红尾鸭嘴鲶鱼、狗仔鲸	亚马逊河与奥里诺科河流域	全国	国外外来物种	性情凶猛，食量大，喜吃活食，对本地鱼类生存形成巨大压力
19	革胡子鲇	<i>Clarias lazera</i>	埃及胡子鲶、埃及塘虱、北非胡鲇	非洲尼罗河流域	全国	国外外来物种	个体大、生长快、易繁殖、适应性强、耐低氧、抗低温，攻击力强，在自然水域易于形成优势种，对本地水生生物造成威胁
20	蟾胡子鲇	<i>Clarias batrachus</i>	泰国胡子鲇、塘虱	南亚和东南亚各国	全国	国外外来物种	适应性强、耐低氧、抗低温，与本地土著种竞争生活空间及饵料资源等；性情较凶猛，喜食幼鱼和鱼卵，严重威胁其他鱼类生存；可能与本地胡子鲇杂交，造成本地种的遗传基因混杂
21	低眼无齿芒	<i>Pangasianodon hypophthalmus</i>	巴沙鱼、淡水白鲳、苏氏圆腹	东南亚湄公河流域	全国	国外外来物种	生长速度快，与本地土著种竞争生存空间及饵料资源，在自然水体可能吞食其他鱼类受精卵，抑制其他鱼类种群增长

常见水生生物外来种、杂交种和选育种名录（禁止放流物种）

序号	物种学名	拉丁文名	别名或俗名	原产地	禁止放流区域	类别	主要危害
22	欧鲃	<i>Silurus glanis</i>	欧洲六须鲃	欧洲中东部	全国	国外外来物种	竞争和繁殖能力强，捕食性强，易对本土物种造成危害
23	豹纹翼甲鲃	<i>Pterygoplichthys pardalis</i>	清道夫、下口鲃、豹纹脂身鲃、吸盘鲃	南美洲亚马逊河流域	全国	国外外来物种	天敌少、繁殖力强，大量吞食鱼卵和鱼苗，严重威胁其他鱼类繁殖生长
24	筛耳鲃	<i>Otocinclus affinis</i>	小精灵、耳孔鲃	南美洲巴西东南部地区	全国	国外外来物种	刮食附生藻类、附着性卵等食物，且繁殖力、适应性较强，可能会对本地植食性物种形成生态位挤占
25	食蚊鱼	<i>Gambusia affinis</i>	柳条鱼、大肚鱼、山坑鱼	中美洲、北美洲	全国	国外外来物种	环境适应性强，直接捕食土著鱼类的鱼卵或鱼苗，导致青鳉、麦穗鱼等物种濒危甚至灭绝，甚至影响当地蛙类、蝾螈螺等两栖动物的生存
26	孔雀花鳉	<i>Poecilia reticulata</i>	凤尾鱼、彩虹 花鳉、虹鳉、 古比鱼	南美洲委内瑞拉、圭亚那、西印度群岛、巴西北部等地.	全国	国外外来物种	繁殖能力强，能耐受污染的水域，具群集性，可能与各地原生鱼类竞争空间与饵料资源，破坏生态平衡
27	剑尾鱼	<i>Xiphophorus Swordtail</i>	剑鱼、青剑	中美洲淡水水系	全国	国外外来物种	适应性较强，繁殖力强，可能与各地原生鱼类竞争空间与饵料资源，破坏生态平衡
28	月光鱼	<i>Xiphophorus maculatus</i>	花斑剑尾、满鱼、新月鱼	中美洲淡水水系	全国	国外外来物种	适应性和繁殖能力都很强，并且能与其他鳉科鱼类杂交，使种质资源混杂

常见水生生物外来种、杂交种和选育种名录（禁止放流物种）

序号	物种学名	拉丁文名	别名或俗名	原产地	禁止放流区域	类别	主要危害
29	黑玛丽鱼	<i>Poecilia sphenops. var</i>	黑摩利	墨西哥	全国	国外外来物种	适应盐度广，能在河口到内陆河区域中生存，本身为改良种，可与本地鲮科鱼类杂交，导致原生种种质资源混杂
30	尼罗罗非鱼	<i>Oreochromis niloticus</i>	罗非鱼、非洲鲫	非洲塞内加尔水系、尼罗河水系和埃及的湖泊，以及沃尔特水系和尼日尔水系	全国	国外外来物种	快速的繁殖速度和大量的种群数量，导致水体内鱼类品种过于单一，挤占其他鱼种生存空间，打破原本的生态平衡。在南方部分水域，其生物量已超过其他土著经济鱼类
31	莫桑比克罗非鱼	<i>Oreochromis mossambicus</i>	非洲鲫鱼、南鲫、越南鱼、吴郭鱼、福寿鱼、爪哇罗非鱼	东非及南非直到伊丽莎白港附近的沿岸水域	全国	国外外来物种	快速的繁殖速度和大量的种群数量，导致水体内鱼类品种过于单一，挤占其他鱼种生存空间，打破原本的生态平衡
32	奥利亚罗非鱼	<i>Oreochromis aureus</i>	蓝罗非鱼、奥利亚吴郭鱼、紫金彩鲷	非洲喀麦隆、乍得、埃及、马里、尼日尔、尼日利亚等国家	全国	国外外来物种	快速的繁殖速度和大量的种群数量，导致水体内鱼类品种过于单一，挤占其他鱼种生存空间，打破原本的生态平衡
33	伦氏罗非鱼	<i>Tilapia rendalli</i>	黑边吴郭鱼、伦氏非鲫	非洲塞内加尔与尼日河，刚果河流域，赞比河水系	全国	国外外来物种	快速的繁殖速度和大量的种群数量，导致水体内鱼类品种过于单一，挤占其他鱼种生存空间，打破原本的生态平衡

常见水生生物外来种、杂交种和选育种名录（禁止放流物种）

序号	物种学名	拉丁文名	别名或俗名	原产地	禁止放流区域	类别	主要危害
34	齐氏罗非鱼	<i>Tilapia zillit</i>	齐氏非鲫、吉利慈鲷	非洲水系	全国	国外外来物种	分布范围最广、危害最大的罗非鱼种类。个体小，环境适应性强，能耐污染 及低氧环境，而且繁殖能力极强，生长迅速，生性凶猛好斗，攻击性明显强于其他罗非鱼，领域性强，对本土原生鱼种会造成伤害
35	伽利略罗非鱼	<i>Sarotherodon galilaeus</i>	加利略帚齿非鲫、伽利略非鲫	非洲及亚洲约旦河的淡水、半咸水水域	全国	国外外来物种	快速的繁殖速度和大量的种群数量，导致水体内鱼类品种过于单一，挤占其他鱼种生存空间，打破原本的生态平衡
36	红罗非鱼	<i>Oreochromis niloticus</i> × <i>Oreochronus mossambicus</i>	彩虹鲷	选育品种，无自然分布区域	全国	选育种	快速的繁殖速度和大量的种群数量，导致水体内鱼类品种过于单一，挤占其他鱼种生存空间，打破原本的生态平衡
37	粉红副尼丽鱼	<i>Paraneetroplus synspilus</i>	紫红火口	中美洲淡水区域	全国	国外外来物种	身体强壮，食性广，适应性强，但性情凶悍，放入本地水体后可能会攻击本地种，并且挤占当地种的生存空间
38	厚唇双冠丽鱼	<i>Amphilophus labiatus</i>	红魔鬼鱼、火鹤鱼、寿星鱼	中美洲的尼尼加拉瓜、哥斯达尼加等地	全国	国外外来物种	具有慈鲷类的领地属性，甚至有强烈的侵略行为，性情凶悍，放入本地水体后可能会攻击本地种，并且挤占当地种的生存空间
39	血鹦鹉	<i>Amphilophus citrinellus</i> × <i>Cichlasoma synspilum</i>	红财神、财神鱼、圣诞老人鱼	选育品种，无自然分布区域	全国	选育种	食性极广，环境适应能力强，可能会挤占其他鱼种生存空间，打破原本的生态平衡

常见水生生物外来种、杂交种和选育种名录（禁止放流物种）

序号	物种学名	拉丁文名	别名或俗名	原产地	禁止放流区域	类别	主要危害
40	马那瓜丽体鱼	<i>Parachromis managuensis</i>	花老虎、淡水石斑鱼、花身副丽鱼	南美洲的洪都拉斯、尼加拉瓜和哥斯达黎加的大西洋水系	全国	国外外来物种	凶猛的肉食性鱼类，已在南方部分地区形成入侵，可能会对本土鱼类产生不利影响
41	蓝鳃太阳鱼	<i>Lepomis macrochirus</i>	蓝鲤鱼、蓝绿鳞鲤太阳鱼	北美洲圣劳伦斯至大湖区和密西西比河流域	全国	国外外来物种	繁殖能力强、广温性鱼类，会吞噬其他鱼类的鱼卵和幼鱼，严重威胁本土鱼类的生存，近年来在我国多地河流屡有发现
42	绿太阳鱼	<i>Lepomis cyanellus</i>	蓝太阳鱼、太阳鱼	北美洲中部	全国	国外外来物种	繁殖能力强、广温性鱼类，会吞噬其他鱼类的鱼卵和幼鱼，具有极强的侵入性，严重威胁本土鱼类的生存，近年来在我国多地河流屡有发现
43	丝足鲈	<i>Osphronemus goramy</i>	招财鱼、古战船	越南、泰国、马来西亚	全国	国外外来物种	肉食性鱼类，具有很强的领域性，会攻击其他鱼类，并且挤占当地种的生存空间
44	大口黑鲈	<i>Micropterus salmoides</i>	加州鲈、加州鲈鱼、黑鲈	加拿大和美国	全国	国外外来物种	生长较快，掠食性强，摄食量大，喜捕食小鱼虾，由于缺乏天敌，在自然水域容易形成优势种，并吞食其他鱼类受精卵和幼鱼，抑制其他鱼类种群数量增长
45	眼斑拟石首鱼	<i>Sciaenops ocellatus</i>	美国红鱼、美国红鲈、斑尾鲈鱼	南大西洋和墨西哥湾沿岸水域	全国	国外外来物种	生长迅速，环境适应能力强，广温广盐性鱼类，食性广，因其生存能力强，并捕食本地鱼类，可能对海洋生态造成不利影响。 近年来在部分沿海区域屡有捕获。

常见水生生物外来种、杂交种和选育种名录（禁止放流物种）

序号	物种学名	拉丁文名	别名或俗名	原产地	禁止放流区域	类别	主要危害
46	尼罗河尖吻鲈	<i>Lates niloticus</i>	隆背金刚、西非战神、金目鲈鱼	非洲北部淡水水系	全国	国外外来物种	体型巨大，性情凶猛，掠食性强，引入将严重危害当地渔业资源，曾引入非洲维多利亚湖造成数百种鱼类灭绝
47	宝石鲈	<i>Scortum barcoo</i>	翡翠斑、宝石鱼、宝石斑	澳大利亚	全国	国外外来物种	可能与各地原生鱼类竞争空间与饵料资源，破坏生态平衡
48	墨瑞鳕	<i>Maccullochella peelii</i>	墨累鳕	澳大利亚	全国	国外外来物种	凶猛肉食性鱼类，可能与各地原生鱼类竞争空间与饵料资源，破坏生态平衡
49	小盾鳢	<i>Channa micropeltes</i>	多曼鱼、鱼虎、大铅笔、红线鳢	东南亚地区	全国	国外外来物种	性极凶猛，可捕食鱼类、虾类、水生昆虫、青蛙和鸟类，可生存于水质较恶劣的水体中，对本地种生存形成较大压力
50	线鳢	<i>Channa striata</i>	泰国鳢、纹月鳢、纹鳢	南亚和东南亚各国	全国	国外外来物种	对环境适应性强，耐污能力强，生长快，凶猛肉食性鱼类，通过捕食严重影响本土鱼类的生存，在台湾已成为入侵物种
51	云斑尖塘鳢	<i>Oxyeleotris marmorata</i>	笋壳鱼、泰国笋壳鱼、泰国鳢	泰国、马来半岛、菲律宾、新加坡、印度尼西亚、澳大利亚至太平洋中部各岛屿	全国	国外外来物种	肉食性鱼类，攻击性强，主要摄食其他小型鱼类、虾、蟹等无脊椎动物，对本地生态环境有强影响力

常见水生生物外来种、杂交种和选育种名录（禁止放流物种）

序号	物种学名	拉丁文名	别名或俗名	原产地	禁止放流区域	类别	主要危害
52	红纹刺鳅	<i>Mastacembelus etythrotaenia</i>	棘鳅、火龙鱼、火刺鳅	泰国、越南、老挝、柬埔寨、印尼及马来西亚的溪流	全国	国外外来物种	肉食性鱼类，摄食底栖动物，由于缺少天敌，易形成本地种群
53	虹鳟	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	淡水三文鱼、瀑布鱼、七色鱼、虹鲑	北美洲的太平洋沿岸及堪察加半岛一带	全国	国外外来物种	由于其具掠食性，可能占据本地鲑科鱼类的生态位，造成其他鱼类种群数量减少
54	褐鳟	<i>Salmo trutta</i>	棕鲤、茶鳟	挪威至北非及爱尔兰至俄罗斯	全国	国外外来物种	与本地鲤鳟鱼类杂交，严重威胁本地鱼类的基因延续性；与本地土著种竞争生活空间及饵料资源等，造成其他鱼类种群数量减少
55	大菱鲆	<i>Scophthalmus maximus</i>	多宝鱼	大西洋东侧欧洲沿岸	全国	国外外来物种	肉食性的底栖鱼类，与本地土著种竞争生活空间及饵料资源等
56	欧洲鳗鲡	<i>Anguilla anguilla</i>	欧鳗	自然分布于大西洋，包括地中海、波罗的海、北非摩洛哥、斯堪的纳维亚半岛等	全国	国外外来物种	与本地土著种竞争生活空间及饵料资源等
57	匙吻鲟	<i>Polyodon spathula</i>	鸭嘴鱼	美国密西西比河水系	全国	国外外来物种	适温范围广、滤食性、生长速度快、可能挤占当地滤食性鱼类生态位

常见水生生物外来种、杂交种和选育种名录（禁止放流物种）

序号	物种学名	拉丁文名	别名或俗名	原产地	禁止放流区域	类别	主要危害
58	西伯利亚鲟	<i>Acipenser baerii</i>	钝吻鲟	俄罗斯西伯利亚地区	除额尔齐斯河水系外禁止放流	区域外来物种	与本地土著种竞争生活空间及饵料资源等，并且可能与本地鲟鱼杂交，使种质资源混杂
59	裸腹鲟	<i>Acipenser nudiiventris</i>	鲟鲤鱼	黑海、亚速海、里海和咸海，我国伊犁河也有分布	除伊犁河水系外全国其他区域	区域外来物种	与本地土著种竞争生活空间及饵料资源等，并且可能与本地鲟鱼杂交，使种质资源混杂
60	小体鲟	<i>Acipenser ruthenus</i>		俄罗斯的黑海、里海、鄂毕河、叶尼塞河等淡水水域	除额尔齐斯河水系外禁止放流	区域外来物种	与本地土著种竞争生活空间及饵料资源等，并且可能与本地鲟鱼杂交，使种质资源混杂
61	眼斑雀鳝	<i>Lepisosteus oculatus</i>	鰐嘴鱼、鸭嘴鰐、虎鰐	美国、加拿大、墨西哥	全国	国外外来物种	生性凶猛，生存能力强，若入侵新的环境下，由于缺少天敌，可能干扰入侵地的生态系统；卵有剧毒误食致死
62	鳄雀鳝	<i>Atractosteus spatula</i>	幽灵火箭、福鰐、大雀鳝、锤骨雀鳝、鳄鱼火箭	从墨西哥到美国的墨西哥湾沿岸河流和河口水域	全国	国外外来物种	由于没有天敌，体型巨大，适应性强，生性凶猛，对土著鱼类构成极大威胁，严重危害当地生态系统；卵有剧毒误食致死
63	巨骨舌鱼	<i>Arapaima gigas</i>	海象鱼、象鱼、大头巨骨舌鱼、军舰龙	南美洲亚马孙河流域	全国	国外外来物种	可能与各地原生鱼类竞争空间与饵料资源；肉食性鱼类，捕食本地种，对本地鱼类生存形成较大压力

常见水生生物外来种、杂交种和选育种名录（禁止放流物种）

序号	物种学名	拉丁文名	别名或俗名	原产地	禁止放流区域	类别	主要危害
64	美丽硬骨舌鱼	<i>Scleropages formosus</i>	金龙鱼、青龙、黄尾金龙、亚洲龙吐珠	马来西亚、印尼 苏门答腊	全国	国外外来物种	可能与各地原生鱼类竞争空间与饵料资源；肉食性鱼类，捕食本地种，对本地鱼类生存形成较大压力
65	双须骨舌鱼	<i>Osteoglossum bicirrhosum</i>	银龙鱼、银龙、银大刀鱼、银带	南美洲亚马孙河流域	全国	国外外来物种	可能与各地原生鱼类竞争空间与饵料资源；肉食性鱼类，捕食本地种，对本地鱼类生存形成较大压力
66	裸臀鱼	<i>Gymnarchus niloticus</i>	尼罗河魔鬼、反天刀	非洲尼罗河流域	全国	国外外来物种	肉食性鱼类，攻击性较强，有放电习性，对本地鱼类生存形成较大压力
67	饰妆铠甲弓背鱼	<i>Chitala ornata</i>	七星刀、大刀	亚洲印度尼西亚、缅甸、泰国等地淡水流域	全国	国外外来物种	可能与各地原生鱼类竞争空间与饵料资源；肉食性鱼类，捕食本地种，对本地鱼类生存形成较大压力
68	佛罗里达鳖	<i>Apalone ferox</i>	珍珠鳖、美国山瑞鳖	美国东南部水系	全国	国外外来物种	肉食性，繁殖能力强，在野外没有天敌，大量捕食青蛙、鱼类等，挤占本地水生动物以及其他鳖类的生存空间，破坏本土的生态平衡和生物多样性
69	大鳄龟	<i>Macrochelys temminckii</i>	真鳄龟	北美洲和中美洲	全国	国外外来物种	生长迅速，生性凶猛，具有很强的攻击性，因缺乏天敌，一旦放生野外，将对本地水生动物构成严重威胁，对生态环境危害巨大
70	小鳄龟	<i>Chelydra serpentina</i>	蛇鳄龟、拟鳄龟	北美洲和中美洲	全国	国外外来物种	生长迅速，生性凶猛，具有很强的攻击性，因缺乏天敌，一旦放生野外，将对本地水生动物构成严重威胁，对生态环境危害巨大

常见水生生物外来种、杂交种和选育种名录（禁止放流物种）

序号	物种学名	拉丁文名	别名或俗名	原产地	禁止放流区域	类别	主要危害
71	巴西红耳龟	<i>Trachemys scripta elegans</i>	红耳龟、密西西比红耳龟、秀丽锦龟、翠龟、麻将龟	原产于北美洲	全国	国外外来物种	食性广，适应能力强，易造成入侵和扩散，与本土龟类争夺生存空间，直接捕食其他水生生物，危害水生生态系统；同时也是沙门氏杆菌的重要传播媒介。
72	湾鳄	<i>Crocodylus porosus</i>	海鳄、咸水鳄、呼雷、食人鳄、河口鳄、咸水鳄、马来鳄	东南亚至澳大利亚北部水系	全国	国外外来物种	食物链顶级捕食者，引入后会对当地生态系统产生严重影响，并且有极强的攻击性，可能对家畜和人类形成危害
73	暹罗鳄	<i>Crocodylus siamensis</i>	泰国鳄、暹罗淡水鳄、新加坡小型鳄	东南亚淡水水系	全国	国外外来物种	适应能力强，摄食量大，为食物链顶级捕食者，引入后会对当地生态系统产生较大影响，并且有较强的攻击性，可能对家畜和人类形成危害
74	泰国虎纹蛙	<i>Rana tigerina</i>	泰国青蛙	泰国	全国	国外外来物种	与本地土著种竞争生活空间及饵料资源等，并且可能与本地种杂交，使种质资源混杂
75	美国牛蛙	<i>Rana catesbeiana</i>	牛蛙、美国水蛙、菜蛙	北美洲落基山脉以东地区	全国	国外外来物种	由于适应性强、食性广、天敌少、寿命长、繁殖能力强，具有明显的竞争优势，易于入侵和扩散，使本地两栖类和各种昆虫面临减少和灭绝的危险
76	海蟾蜍	<i>Rhinella marina</i>	甘蔗蟾蜍、美洲巨蟾蜍、南美巨蛙、	南美洲和中美洲	全国	国外外来物种	与本地土著种竞争生活空间及饵料资源等，危害生态系统；能分泌蟾毒素，对于多种动物都是有毒的
77	墨西哥钝口螈	<i>Ambystoma mexicanum</i>	六角恐龙、美西螈、墨西哥钝口螈	墨西哥	全国	国外外来物种	与本地土著种竞争生活空间及饵料资源等，可能挤占当地两栖物种的生态位

常见水生生物外来种、杂交种和选育种名录（禁止放流物种）

序号	物种学名	拉丁文名	别名或俗名	原产地	禁止放流区域	类别	主要危害
78	凡纳滨对虾	<i>Litopenaeus vannamei</i>	南美白对虾、凡纳对虾、白肢虾、白对虾	南美太平洋沿岸的海域	全国	国外外来物种	与本地种竞争生活空间及饵料资源等，并且可能与本地虾类杂交，使种质资源混杂
79	罗氏沼虾	<i>Macrobrachium rosenbergii</i>	淡水长臂大虾、泰国虾、马来西亚大虾	原产于日本	全国	国外外来物种	与本地土著种争夺生活空间与饵料资源，压制本地种生存发展
80	红螯螯虾	<i>Cherax quadricarinatus</i>	四脊光壳螯虾、澳洲淡水龙虾	澳大利亚	全国	国外外来物种	与本地种争夺生活空间与饵料资源，同时会捕食原生虾类的卵和幼体，威胁本地种生存发展
81	克氏原螯虾	<i>Procambarus clarkii</i>	小龙虾	北美洲	全国	国外外来物种	抗逆性强，繁殖速度快，能在各种水体中生存，与本地种争夺生活空间与饵料资源；喜欢穴居，擅长打洞，会导致灌溉用水的流失，破坏农田甚至危及水库大坝
82	硬壳蛤	<i>Mercenaria mercenaria</i>	小圆蛤、北方帘蛤、美洲帘蛤、小蛤蜊	美国东海岸	全国	国外外来物种	耐污能力强，摄食量大，与本地种争夺生存空间与饵料资源，压制本地种生存，严重降低当地生物多样性
83	沙筛贝	<i>Mytilopsis sallei</i>	萨氏仿贻贝	中美洲热带海域	全国	国外外来物种	繁殖能力强，与本地贝类争夺附着基和饵料资源，排挤本地种生存，严重降低生物多样性；大量繁殖影响港口通航；污损腐蚀近海基础设施及养殖网箱设备等
84	虾夷扇贝	<i>Patinopecten yessoensis</i>	夏威夷贝、夏夷贝	俄罗斯千岛群岛南部水域、日本北海道及本州岛北部	全国	国外外来物种	与本地种争夺生活空间与食物资源，压制本地种生存发展，同时可能与本地种杂交，使种质资源混杂

常见水生生物外来种、杂交种和选育种名录（禁止放流物种）

序号	物种学名	拉丁文名	别名或俗名	原产地	禁止放流区域	类别	主要危害
85	海湾扇贝	<i>Argopecten irradians</i>	红贝	美国大西洋沿岸	全国	国外外来物种	与本地种争夺生活空间与食物资源，压制本地种生存发展，同时可能与本地种杂交，使种质资源混杂
86	福寿螺	<i>Pomacea canaliculata</i>	大瓶螺	亚马逊河流域	全国	国外外来物种	危害社会公共卫生安全，食用可能引起寄生虫感染；危害农业生产，主要危害水稻、茭白等水生作物；种群增长迅速，与生态系统内水生生物争夺生存空间、食物，威胁本地物种生存，侵入水体土著生物大量减少
87	指甲履螺	<i>Crepidula onyx</i>	指甲螺	中美洲海域	全国	国外外来物种	与本地种争夺生存空间与饵料资源，压制本地种生存，严重降低当地生物多样性；附着在经济贝类壳上，影响生长和繁殖；污损腐蚀近海基础设施及养殖网箱设备等
88	地中海贻贝	<i>Mytilus galloprovincialis</i>	蓝贻贝	地中海、黑海和亚得里亚海	全国	国外外来物种	与本地种争夺生存空间与饵料资源，挤占本地种的生存空间；可与本地种杂交，造成基因污染。
89	平角卷螺	<i>Planorbella duryi</i>	苹果螺、杜式丽卷螺	南美洲亚马逊河流域	全国	国外外来物种	与本地螺类争夺生存空间与饵料资源，挤占本地螺类的生存空间
90	虾夷马粪海胆	<i>strongylocentrotus intermedius</i>	海胆	日本北海道及以北沿海	全国	国外外来物种	可与本地种杂交，引起种质资源混杂；与本地原生海胆和其他植食性动物争夺生存空间与饵料资源，挤占本地螺类的生存空间

常见水生生物外来种、杂交种和选育种名录（禁止放流物种）

序号	物种学名	拉丁文名	别名或俗名	原产地	禁止放流区域	类别	主要危害
91	空心莲子草	<i>Alternanthera philoxeroides</i>	喜旱莲子草、水花生	南美洲的巴西、乌拉圭、阿根廷	全国	国外外来物种	全球性入侵物种，排挤生境中的其他植物，使群落物种单一化，影响农渔业生产、航运、湿地景观等
92	凤眼莲	<i>Eichhornia crassipes</i>	水葫芦、凤眼蓝、水浮莲	巴西	全国	国外外来物种	繁殖能力极强，一旦有适合它生长的环境，便快速生长，并成为当地的优势物种，抑制或影响其他物种的生长，破坏生物多样性和生态平衡
93	大藻	<i>Pistia stratiotes</i>	水白菜、水莲花、大叶莲	巴西	全国	国外外来物种	堵塞航道，影响水产养殖业，并导致沉水生植物死亡和灭绝，危害水生生态系统
94	互花米草	<i>Spartina alterniflora</i> Loisel.		北美洲大西洋沿岸	全国	国外外来物种	抑制或影响其他本土植物的生长，破坏本土海岸生态系统；大量繁殖侵占滩涂，破坏近海生物栖息环境，影响滩涂养殖 I 堵塞航道，影响船只出港
95	北美海蓬子	<i>Salicornia bigelovii</i>	西洋海笋	北美洲沿海沼泽	全国	国外外来物种	抑制或影响其他本土植物的生长，破坏本土海岸生态系统
96	水盾草	<i>Cabomba caroliniana</i>	白花穗莼、菊花草	南美洲	全国	国外外来物种	在自然水体中能够迅速繁殖，甚至堵塞河道，影响水体功能；排挤生境中的其他水生植物，对生物多样性造成影响

常见水生生物外来种、杂交种和选育种名录（禁止放流物种）

序号	物种学名	拉丁文名	别名或俗名	原产地	禁止放流区域	类别	主要危害
97	麦穗鱼	<i>Pseudorasbora parva</i>	麦穗	除西北内流区、西南跨国诸河流域、青藏高原及海南等区域外的大部分水系	西北内流区、西南跨国诸河流域、青藏高原及海南	区域外来物种	与本地种竞争生活空间与食物资源，抑制和影响本地种生存发展，破坏原有水域生物多样性和生态平衡
98	子陵吻虾虎鱼	<i>Rhinogobius giurinus</i>	栉虾虎、子陵栉下鰕虎鱼、朝天眼、极乐吻鰕虎	除西北内流区、西南跨国诸河流域、青藏高原等区域外的大部分水系	西北内流区、西南跨国诸河流域、青藏高原	区域外来物种	因其适应能力强、繁殖力高、生命周期短，短时间在新的水域可以形成优势种群。不仅与土著鱼类竞争食物和空间，而且吞食土著鱼卵，对土著鱼类的生存造成相当压力，致使土著鱼类的数量减少甚至绝迹。
99	大银鱼	<i>Protosalanx hyalocranius</i>	面条鱼、面丈鱼、泥鱼	渤海、黄海、东海沿海及长江、淮河等中下游的水系	西北内流区、西南跨国诸河流域、青藏高原、华南、海南岛	区域外来物种	与本地种竞争生活空间与食物资源，抑制和影响本地种生存发展，破坏原有水域生物多样性和生态平衡
100	池沼公鱼	<i>Hypomesus olidus</i>	黄瓜鱼	黑龙江、图门江下游以及鸭绿江中下游	原产地以外的区域	区域外来物种	与本地种竞争生活空间与食物资源，抑制和影响本地种生存发展，破坏原有水域生物多样性和生态平衡
101	团头鲂	<i>Megalobrama amblycephala</i>	缩项鲂、武昌鱼	长江中下游的通江湖泊	原产地以外的区域	区域外来物种	与本地种竞争生活空间与食物资源，抑制和影响本地种生存发展，破坏原有水域生物多样性和生态平衡

常见水生生物外来种、杂交种和选育种名录（禁止放流物种）

序号	物种学名	拉丁文名	别名或俗名	原产地	禁止放流区域	类别	主要危害
102	额河银鲫	<i>Carassius auratus gibelio</i>		额尔齐斯河	原产地以外的区域	区域外来物种	与本地种竞争生活空间与食物资源，抑制和影响本地种生存发展，破坏原有水域生物多样性和生态平衡
103	方正银鲫	<i>Carassius auratus var.</i>		黑龙江方正河流域	原产地以外的区域	区域外来物种	与本地种竞争生活空间与食物资源，抑制和影响本地种生存发展，破坏原有水域生物多样性和生态平衡
104	丁鲃	<i>Tinea tinea</i>	欧洲丁鲃、丁桂鱼、须鲃	新疆额尔齐斯河和乌伦古河	原产地以外的区域	区域外来物种	与本地种竞争生活空间与食物资源，抑制和影响本地种生存发展，破坏原有水域生物多样性和生态平衡
105	梭鲈	<i>Sander lucioperca</i>	小狗鱼、牙鱼、白梭吻鲈	新疆额尔齐斯河	原产地以外的区域	区域外来物种	与本地种竞争生活空间与食物资源，抑制和影响本地种生存发展，破坏原有水域生物多样性和生态平衡
106	河鲈	<i>Perca pluviatilis</i>	五道黑	新疆额尔齐斯河和乌伦古河	原产地以外的区域	区域外来物种	与本地种竞争生活空间与食物资源，抑制和影响本地种生存发展，破坏原有水域生物多样性和生态平衡
107	乌鳢	<i>Channa argus</i>	黑鱼、乌鱼、乌棒、蛇头鱼	除西北内流区、西南跨国诸河流域、青藏高原及海南等区域外的大部分水系	原产地以外的区域	区域外来物种	凶猛肉食性鱼类，与本地种竞争生活空间与食物资源，直接捕食其他水生生物，破坏原有水域生物多样性和生态平衡

常见水生生物外来种、杂交种和选育种名录（禁止放流物种）

序号	物种学名	拉丁文名	别名或俗名	原产地	禁止放流区域	类别	主要危害
108	台湾泥鳅	<i>Paramisgurnus dabryanus</i>		选育品种，无自然分布区域	全国	选育种	直接影响生物遗传多样性，造成相关物种种质混杂，种群退化，影响天然资源的有效利用
109	全雄黄颡鱼	<i>Pelteobagrus fulvidraco</i>	黄辣丁、黄姑子、黄沙古、黄角丁	选育品种，无自然分布区域	全国	选育种	直接影响生物遗传多样性，造成相关物种种质混杂，种群退化，影响天然资源的有效利用
110	中国对虾“黄海3号”	<i>Penaeus chinensis</i>	中国明对虾、东方对虾	选育品种，无自然分布区域	全国	选育种	直接影响生物遗传多样性，造成相关物种种质混杂，种群退化，影响天然资源的有效利用
111	脊尾白虾“黄育1号”	<i>Exopalaemon carinicauda</i>		选育品种，无自然分布区域	全国	选育种	直接影响生物遗传多样性，造成相关物种种质混杂，种群退化，影响天然资源的有效利用
112	三疣梭子蟹“黄选1号”	<i>Portunus trituberculatus</i>	梭子蟹、枪蟹、海螃蟹、海蟹	选育品种，无自然分布区域	全国	选育种	直接影响生物遗传多样性，造成相关物种种质混杂，种群退化，影响天然资源的有效利用
113	建鲤	<i>Cyprinus carpio</i> var. <i>jian</i>		选育品种，无自然分布区域	全国	选育种	直接影响生物遗传多样性，造成相关物种种质混杂，种群退化，影响天然资源的有效利用
114	锦鲤	<i>Cyprinus carpio</i> var.	红鲤鱼、花脊鱼	选育品种，无自然分布区域	全国	选育种	直接影响生物遗传多样性，造成相关物种种质混杂，种群退化，影响天然资源的有效利用
115	金鱼	<i>Carassius auratus</i> Linnaeus		选育品种，无自然分布区域	全国	选育种	直接影响生物遗传多样性，造成相关物种种质混杂，种群退化，影响天然资源的有效利用
116	福瑞鲤	<i>Cyprinus carpio</i> var.		选育品种，无自然分布区域	全国	选育种	直接影响生物遗传多样性，造成相关物种种质混杂，种群退化，影响天然资源的有效利用

常见水生生物外来种、杂交种和选育种名录（禁止放流物种）

序号	物种学名	拉丁文名	别名或俗名	原产地	禁止放流区域	类别	主要危害
117	超级鲤	<i>Cyprinus carpio var.</i>		选育品种，无自然分布区域	全国	选育种	直接影响生物遗传多样性，造成相关物种种质混杂，种群退化，影响天然资源的有效利用
118	长丰鲢	<i>Changfeng silver carp</i>		选育品种，无自然分布区域	全国	选育种	直接影响生物遗传多样性，造成相关物种种质混杂，种群退化，影响天然资源的有效利用
119	团头鲂“浦江1号”	<i>Megalobrama amblycephala ver.</i>	缩项鲂、武昌鱼	选育品种，无自然分布区域	全国	选育种	直接影响生物遗传多样性，造成相关物种种质混杂，种群退化，影响天然资源的有效利用
120	湘云鲫	<i>Carassius auratus var.</i>		选育品种，无自然分布区域	全国	选育种	直接影响生物遗传多样性，造成相关物种种质混杂，种群退化，影响天然资源的有效利用
121	松浦镜鲤	<i>Cyprinus carpio var.</i>		选育品种，无自然分布区域	全国	选育种	直接影响生物遗传多样性，造成相关物种种质混杂，种群退化，影响天然资源的有效利用
122	异育银鲫	<i>Cyprinus carpio var. singuonensis × Carassius auratus gibelio</i>		选育品种，无自然分布区域	全国	选育种	直接影响生物遗传多样性，造成相关物种种质混杂，种群退化，影响天然资源的有效利用
123	杂交鲟（小杂）	<i>Huso huso × Acipenser ruthenus</i>		杂交品种，无自然分布区域	全国	杂交种	与本地土著种竞争生活空间及饵料资源等，并且可能与本地鲟鱼杂交，使种质资源混杂
124	杂交鲟（西杂）	<i>Acipenser baerii × Acipenser schrencki</i>		杂交品种，无自然分布区域	全国	杂交种	与本地土著种竞争生活空间及饵料资源等，并且可能与本地鲟鱼杂交，使种质资源混杂

常见水生生物外来种、杂交种和选育种名录（禁止放流物种）

序号	物种学名	拉丁文名	别名或俗名	原产地	禁止放流区域	类别	主要危害
125	杂交鲟（大杂）	<i>Huso huso</i> × <i>Acipenser schrencki</i>		杂交品种，无自然分布区域	全国	杂交种	与本地土著种竞争生活空间及饵料资源等，并且可能与本地鲟鱼杂交，使种质资源混杂
126	杂交鳊“杭鳊1号”	<i>Channa maculata</i> ♀ × <i>Chnna argus</i> ♂		杂交品种，无自然分布区域	全国	杂交种	直接影响生物遗传多样性，造成相关物种种质混杂，种群退化，影响天然资源的有效利用

备注：外来物种是指在某地区或生态系统原来不存在、由于人类活动引入的物种。其中来自国际间的称为国外外来物种，来自同一国家不同区域的称为某区域外来物种。与外来种相对应的是土著种或本地种。